

Groupama AgroMeteo

Perspectiva meteorologică pentru luna Noiembrie 2017

- ✓ Caracteristici agrometeo
- ✓ Starea de vegetație

Recomandări de specialitate

Diagnoza lunii Octombrie 2017

- ✓ Caracteristici agrometeo
- ✓ Starea de vegetație

PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2017

Pentru luna NOIEMBRIE 2017, informațiile de la Centrul European pentru Prognoza Vremii (ECMWF) estimează pentru România următoarele:

- Pe ansamblu, în luna noiembrie 2017, temperaturile medii se vor situa peste normele climatologice în sudul, sud-estul și local în vestul țării. În restul regiunilor agricole, valorile medii din aer vor fi apropiate de mediile multianuale.
- Pe majoritatea suprafețelor agricole se prognozează un regim pluviometric excedentar, exceptând areale restrânse din vest și sud, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate normalul perioadei.

Precizăm că, aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

Caracteristici agrometeorologice

La sfârșitul lunii Noiembrie 2017, aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a țării. Conținutul de umiditate din sol va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată și puternică), pe suprafețe agricole extinse din Dobrogea și Moldova, precum și local în vestul Banatului.

Starea de vegetație a culturilor agricole

Ca urmare, procesele biologice la culturile de **rapiță, orz și grâu** de toamnă semănate în epoca optimă vor evolua pe ansamblu normal în aproape toate regiunile agricole, exceptând depresiunile nordice și centrale, unde ritmurile de dezvoltare ale plantelor vor fi mai lente și chiar stagnante temporar. Starea de vegetație a culturilor se va menține bună și medie îndeosebi în semănăturile efectuate în perioada optimă, iar la cele întârziate fenologic, uniformitatea și vigurozitatea plantelor va fi medie și slabă, iar densitatea redusă.

În funcție de condițiile pedo-climatice și agrotehnica aplicată, cerealierele de toamnă (**orz și grâu**) se vor afla în diferite faze vegetative, respectiv germinare-răsărire-formarea frunzei a treia și înfrățire. Cele mai avansate fenologic vor fi culturile din jumătatea de sud a țării, aflate predominant la înfrunzire și înfrățire.

Cultura de **rapiță** înființată în perioada optimă va parcurge predominant înfrunzirea, cu o stare de vegetație pe ansamblu bună și medie. Totodată, în semănăturile efectuate tardiv plantele nu vor beneficia de resurse termice necesare pentru parcurgerea integrală a proceselor de vernalizare și călire.

Speciile **pomicole și viticole** vor intra treptat în stadiul de repaus biologic, acestea având pe ansamblu o bună rezistență la temperaturile scăzute de pe parcursul iernii. În zilele cu precipitații, lucrările agricole specifice de sezon (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături de toamnă, fertilizări, etc) vor fi sistate temporar.

Prognoza meteorologică sezonieră se elaborează cu anticipație de 1-3 luni având caracter orientativ și grad de realizare de peste 60-65%. De aceea, aceste estimări sezoniere sunt permanent actualizate prin prognozele pe termen scurt (1-3 zile) și mediu (7-10 zile), cu un grad de realizare de peste 87-95%.

Recomandări de specialitate/calendarul lucrărilor agricole:

- Finalizarea arăturilor adânci de toamnă;
- Verificarea sistematică a viabilității plantelor la cerealierele de toamnă, precum și a elementelor de rod la speciile pomi-viticole;
- Încorporarea gunoii de grajd în câmp și fertilizarea cu îngrășăminte minerale complexe pe bază de fosfor și potasiu;
- Aplicarea tratamentelor fito-sanitare în plantațiile pomi-viticole.

Starea de vegetație a culturilor agricole

Pe parcursul lunii octombrie 2017, a predominat în general un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, iar în a doua parte a intervalului s-a produs o răcire treptată în evoluția vremii, aceasta devenind normală. Astfel, procesele de creștere și dezvoltare la culturile de toamnă (rapită, orz și grâu) au avut o evoluție normală, în cea mai mare parte a țării. Starea de vegetație a plantelor se prezintă bună și medie în semănăturile efectuate în epoca optimă, iar în culturile înființate tardiv, uniformitatea și vigurozitatea plantelor s-a menținut medie și slabă. În funcție de data semănăturii, cerealierele de toamnă (orz și grâu) parcurg germinarea și răsărirea (50-100%), precum și apariția frunzei a treia (10-60%) la culturile înființate în perioada optimă. Rapița înregistrează fazele de răsărire (30-100%) și formarea aparatului foliar (3-8 frunze), în cea mai mare parte a zonelor de cultură. În toate bazinele specializate, la sfecla de zahăr s-au continuat lucrările de recoltare. La speciile pomicole și viticole se semnalează maturarea lemnului/coadelor, îngălbenirea/căderea fiziologică a frunzelor și recoltarea la varietățile târzii.

În general, condițiile agrometeorologice au favorizat desfășurarea lucrărilor agricole în câmp (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, fertilizări, recoltarea de pe ultimele suprafețe), exceptând zilele cu precipitații.

Caracteristici agrometeorologice

La data de 31 Octombrie 2017, gradul de aprovizionare cu apă în cultura grâului de toamnă, pe profilul de sol 0-20 cm, prezintă valori satisfăcătoare (AS), apropiate de optim (ApO) și optime (AO), în aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată-SM și puternică-SP) se înregistrează local în estul și izolat în nord-estul Moldovei, centrul și estul Dobrogei, nord-vestul și vestul Banatului, figura 1.




Figura 1.

Groupama Asigurări în parteneriat cu **A.N.M.** îți oferă prognoza agrometeorologică. Înscrie adresa de e-mail și ai acces gratuit la informații specializate pentru lucrările agro.

Abonează-te la newsletter