

Groupama AgroMeteo

Perspectiva meteorologică pentru luna Ianuarie 2018

- ✓ Caracteristici agrometeo
- ✓ Starea de vegetație

Recomandări de specialitate

Diagnoza lunii Decembrie 2017

- ✓ Caracteristici agrometeo
- ✓ Starea de vegetație

PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU LUNA IANUARIE 2018

Pentru luna IANUARIE 2018, informațiile de la Centrul European pentru Prognoza Vremii (ECMWF) estimează pentru România următoarele:

- Sub aspect termic, luna ianuarie 2018 se va caracteriza printr-o vreme apropiată de normele climatologice, în aproape toată țara. În regiunile sud-estice, sudice și vestice, temperaturile medii diurne ale aerului vor prezenta valori mai ridicate în raport cu mediile multianuale lunare.
- Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice în zonele estice și sud-estice, iar în restul teritoriului vor fi excedentare.

Precizăm că, aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

Caracteristici agrometeorologice

La sfârșitul lunii ianuarie 2018, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, pe aproape întreg teritoriul agricol. Deficite de apă în sol (seceță pedologică moderată și puternică) se vor înregistra izolat în sud-estul, estul și vestul țării.

Starea de vegetație a culturilor agricole

În condițiile agrometeorologice menționate, la culturile de toamnă se va menține repausul biologic, în cea mai mare parte a teritoriului agricol. De asemenea, în zilele cele mai reci, pe fondul temperaturilor minime scăzute, situate sub limitele biologice critice de rezistență a plantelor (-7...-10...-15°C), precum și în absența stratului protector de zapadă sau a unui strat superficial (sub 10 cm), atât în culturile de toamnă semănate în epoca optimă, cât și în cele tardive, plantele vor fi expuse gerului, semnalându-se brunificări și arsuri ale vârfului frunzelor, precum și îngălbenirea sau uscarea celor bazale.

Cerealierele de toamnă (orz și grâu) semănate în perioada optimă vor parcurge dezvoltarea aparatului foliar și înfrățirea, cu o stare de vegetație în general bună și medie. Culturile înființate tardiv se vor afla în fazele de răsărire și formarea frunzei a treia, uniformitatea și vigurozitatea plantelor fiind pe ansamblu medie și slabă.

Cultura de rapiță va înregistra faza de înfrunzire, pe majoritatea suprafețelor agricole.

În toate **plantațiile pomi-viticole** se va continua repausul biologic, speciile fiind în general bine adaptate la condițiile de pe parcursul iernii.

În zilele cu precipitații, lucrările agricole în câmp vor fi întrerupte temporar.

Prognoza meteorologică sezonieră se elaborează cu anticipație de 1-3 luni având caracter orientativ și grad de realizare de peste 60-65%. De aceea, aceste estimări sezoniere sunt permanent actualizate prin prognozele pe termen scurt (1-3 zile) și mediu (7-10 zile), cu un grad de realizare de peste 87-95%.

Recomandări de specialitate/calendarul lucrărilor agricole:

- ✓ Continuarea efectuării controlului biologic în vederea determinării viabilității plantelor la speciile de toamnă și a evoluției mugurilor de rod la **pomii fructiferi și vița de vie**;
- ✓ Efectuarea lucrărilor de întreținere (**fertilizări cu îngrășăminte organice, tăieri de rodire**) în vii și livezi;
- ✓ Aplicarea **îngrășămintelor minerale** pe bază de **azot și potasiu** la **culturile de toamnă** înființate în epoca optimă.

DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 01 – 28 DECEMBRIE 2017

Starea de vegetație a culturilor agricole

În luna decembrie 2017, a predominat un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, pe aproape întreg teritoriul agricol. Astfel, ritmurile de creștere și dezvoltare ale culturilor de toamnă s-au desfășurat în general normal, exceptând zonele depresionare nordice și centrale unde s-a menținut starea de repaus vegetativ. Culturile de **orz** și **grâu** de toamnă parcurg răsărirea, apariția frunzei a treia și înfrățirea (10-100%), starea de vegetație a plantelor fiind bună și medie. La **rașița** semănată în epoca optimă se înregistrează faza de înfrunzire (6-12 frunze), la nivelul întregii țări. **Pomii fructiferi** și **vița de vie** și-au continuat stadiul de repaus biologic în toate plantațiile. În condițiile agrometeorologice menționate, lucrările agricole (arături, fertilizări, lucrări de întreținere în vii și livezi) au fost sistate temporar doar în zilele cu precipitații.

Caracteristici agrometeorologice

La data de 28 Decembrie 2017, în cultura **grâului** de toamnă, aprovizionarea cu apă a solului, pe profilul 0-100 cm, prezintă valori satisfăcătoare (AS), apropiate de optim (ApO) și optime (AO), pe majoritatea suprafețelor agricole. Izolat în centrul, estul, nordul și nord-estul Moldovei, nord-vestul Banatului, centrul și estul Dobrogei, se înregistrează deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată-SM și puternică-SP), figura 1.




Figura 1.

Groupama Asigurări în parteneriat cu **A.N.M.** îți oferă prognoza agrometeorologică. Înscrie **adresa de e-mail** și ai acces gratuit la informații specializate pentru lucrările agro.

Abonează-te la newsletter