

Groupama AgroMeteo

Perspectiva meteorologică pentru luna februarie 2017

- ⇒ Caracteristici agrometeo
- ⇒ Starea de vegetație

Recomandări de specialitate

Diagnoza lunii ianuarie 2017

- ⇒ Caracteristici agrometeo
- ⇒ Starea de vegetație

Perspectiva lunii februarie

-  Pe ansamblu, luna februarie 2017 se va caracteriza printr-o vreme mai rece sub aspect termic, în cea mai mare parte a țării. Local, în regiunile sudice, sud-estice și cele vestice, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi apropiate de normele climatologice.
-  Se prognozează cantități de precipitații apropiate de mediile multianuale pe aproape întreg teritoriul agricol, exceptând centrul și local vestul țării unde acestea vor avea o tendință de excedent.

Aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

Caracteristici agrometeorologice

În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 cm, se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în majoritatea regiunilor agricole. Deficite moderate de umiditate în sol se vor menține în sud-estul țării.

Starea de vegetație a culturilor agricole

În aceste condiții, culturile de toamnă și speciile pomi-viticole vor înregistra în continuare starea de repaus biologic, pe aproape întreg teritoriul agricol, exceptând zonele de câmpie din jumătatea de sud a țării, unde local, în perioadele calde vor fi posibile reluări lente și temporare ale proceselor vegetative, îndeosebi la cerealierele de toamnă (orz și grâu) înființate în epoca optimă. Totodată, pe fondul temperaturilor minime scăzute din aer, pe suprafețele agricole fără strat protector de zăpadă sau cu strat superficial (sub 10 cm), vor fi posibile vătămări ale aparatului foliar prin brunificări și arsuri ale vârfului frunzelor. De asemenea, în condițiile alternanței îngheț-dezgheț a solului se va putea semna fenomenul de “descălțare” al plantelor.

Orz	Cerealierele de toamnă (orz și grâu) semănate
Grâu de toamnă	în epoca optimă și bine adaptate la condițiile de iernare vor parcurge formarea frunzei a treia și înfrățirea, starea de vegetație a plantelor menținându-se pe ansamblu bună și medie. Culturile înființate tardiv se vor afla în fazele de răsărire și apariție a frunzei a treia, vigurozitatea și uniformitatea plantelor fiind în general medie și slabă.
Rapiță	Cultura de rapiță va înregistra înfrunzirea, plantele prezentând în general o stare de vegetație bună și medie, respectiv medie și slabă în semănăturile efectuate în afara epocii optime.
Pomii fructiferi	În toate plantațiile, speciile pomi-viticole își vor menține stadiul de repaus vegetativ, acestea având o bună rezistență la temperaturile scăzute de pe parcursul iernii.
Vița de vie	

Lucrările agricole specifice (aplicarea îngrășămintelor organice și chimice, tăieri de rodire, etc.) vor fi întrerupte temporar în zilele cu precipitații.

Recomandări de specialitate

-  Controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilității plantelor la culturile de toamnă și a elementelor de rod la speciile pomi-viticole;
-  Administrarea îngrășămintelor minerale pe bază de azot la cerealierele de toamnă, precum și efectuarea arăturilor pe suprafețele fără strat de zăpadă;
-  Lucrări de întreținere (fertilizări cu îngrășăminte organice, tăieri de rodire, tratamente fito-sanitare) în vii și livezi.

Diagnoza lunii ianuarie

Starea de vegetație a culturilor agricole



În luna ianuarie 2017, a predominat un regim termic al aerului în general mai scăzut decât în mod normal, pe aproape întreg teritoriul agricol. Ca urmare, culturile de câmp, pomii fructiferi și vița de vie s-au aflat în starea de repaus biologic, la nivelul întregii țări. În zilele cele mai reci, pe fondul temperaturilor minime din aer și sol situate frecvent sub pragurile biologice critice de rezistență ale plantelor ($T_{min.} \leq -10...-15...-20^{\circ}C$), precum și în absența unui strat protector de zăpadă, la culturile de toamnă s-au produs brunificări și arsuri ale vârfului frunzelor.

Rapiță

La cultura de rapiță s-a continuat faza de dezvoltare a aparatului foliar (6-13 frunze), cu 1-2 frunze bazale îngălbenite, pe aproape întreg teritoriul agricol.

Orz

Grâu de toamnă

La cerealierele de toamnă (orz și grâu), funcție de data semănatului s-a semnalat fazele de apariție a frunzei a treia (40-100%) și înfrățire (10-100%), iar la cele tardive au predominat răsărirea și apariția frunzei a treia (10-100%).

Pomi fructiferi

Vița de vie

Speciile pomi-viticole și-au menținut starea de repaus vegetativ în toate plantațiile, acestea fiind în general bine adaptate la condițiile de iernare.

Starea de vegetație a plantelor se prezintă pe ansamblu medie și slabă. În zilele cu precipitații, lucrările agricole de sezon au fost sistate temporar, la nivelul întregii țări.

Caracteristici agrometeorologice

La sfârșitul lunii ianuarie 2017, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, prezintă valori satisfăcătoare (AS) până la apropiate de optim (ApO) și optime (AO), în majoritatea regiunilor agricole. În centrul Dobrogei se înregistrează deficite de apă în sol (secetă pedologică moderată-SM), figura 1.




Figura 1.

Groupama Asigurări în parteneriat cu **A.N.M.** îți oferă prognoza agrometeorologică.

Înscrie adresa de e-mail și ai acces gratuit la informații specializate pentru lucrările agro.

[**Abonează-te la newsletter**](#)