

Groupama AgroMeteo

Perspectiva meteorologică pentru luna iulie 2017

- ⇒ Caracteristici agrometeo
- ⇒ Starea de vegetație

Recomandări de specialitate

Diagnoza lunii iunie 2017

- ⇒ Caracteristici agrometeo
- ⇒ Starea de vegetație

Perspectiva lunii iulie

-  Pe parcursul lunii iulie 2017 va predomina un regim termic mediu al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit în aproape toată țara, îndeosebi în sudul, sud-estul și vestul țării.
-  Sub aspect pluviometric, cantitățile de precipitații vor înregistra valori sub mediile multianuale, pe aproape întreg teritoriul. În sudul, sud-estul și estul țării, deficitul de apă vor fi mai pronunțate.

Aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

Caracteristici agrometeorologice

Aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 cm în cultura de porumb la sfârșitul lunii iulie 2017, va prezenta valori scăzute și deosebit

de scăzute, seceta pedologică având diferite grade de intensitate, respectiv moderată, puternică și local chiar extremă, pe suprafețe agricole extinse din sudul, vestul și estul teritoriului. În centrul, nord-vestul și izolat în sud-estul țării, rezerva de umiditate din sol se va situa în limite satisfăcătoare și local apropiate de optim.

Starea de vegetație a culturilor agricole

Ca urmare, în zilele cele mai calde, pe fondul temperaturilor maxime ridicate din aer, situate frecvent peste pragurile biologice critice (30...32°C) de rezistență ale culturilor prășitoare se va putea înregistra ofilirea temporară, răsucirea și uscarea parțială a aparatului foliar îndeosebi în orele amiezii, precum și forțări stadiale. În general, starea de vegetație a culturilor semănate în perioada optimă va fi bună și medie pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului, iar în semănăturile tardive, precum și pe terenurile afectate de seceta pedologică, uniformitatea și vigurozitatea plantelor se va menține medie și slabă.

Grâu de toamnă La grâul de toamnă se vor continua și chiar finaliza lucrările de recoltare, iar la cele întârziate fenologic se va înregistra predominant faza de maturitate deplină, declanșându-se totodată, recoltarea.

Floarea-soarelui În funcție de data semănatului, cultura de floarea-soarelui se va afla în fazele de înflorire, maturitate în ceară și deplină, în aproape toată țara.

Porumb Sub aspect fenologic, porumbul va parcurge înflorirea paniculului, mătăsirea și maturitatea în lapte. Cele mai avansate în vegetație vor fi culturile din sudul și vestul teritoriului, în special hibrizii timpurii, la care se va semnala maturitatea în ceară.

Sfecla de zahăr În principalele bazine specializate, la sfecla de zahăr vor predomina îngroșarea axei hipocotile și acumularea zaharurilor, iar la cartof, formarea

și creșterea tuberculilor, precum și veștejirea vrejilor la soiurile de vară.

Pomii fructiferi

La speciile de sâmburoase (cais, piersic, prun) aflate la maturitatea tehnologică se va continua recoltarea, iar la cele de semințoase (măr, păr) acumularea zaharurilor și coacerea fructelor, în majoritatea plantațiilor pomicole.

Vița de vie

În cea mai mare parte a podgoriilor, vița de vie va parcurge înfrunzirea, creșterea și dezvoltarea boabelor, iar la soiurile timpurii și extratimpurii din sudul și estul țării, acumularea zaharurilor și coacerea în „pârgă”.

Lucrările agricole de sezon se vor efectua în general în condiții bune, exceptând zilele cu precipitații.

Recomandări de specialitate

-  Aplicarea irigațiilor pe terenurile cu deficite de umiditate în sol;
-  Combaterea buruienilor prin erbicidări, prașile manuale și mecanice la culturile prășitoare;
-  Continuarea aplicării tratamentelor fito-sanitare la speciile de câmp și pomi-viticole;
-  Efectuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la cerealierele de toamnă;
-  Eliberarea suprafețelor agricole de resturile vegetale.

Diagnoza lunii iunie

Starea de vegetație a culturilor agricole

Luna iunie 2017 s-a caracterizat printr-o vreme normală la începutul intervalului, după care, regimul termic al aerului a fost deosebit de ridicat în sudul, sud-estul și vestul teritoriului. Ca urmare, procesele fiziologice la toate culturile agricole au fost intensificate pe majoritatea suprafețelor, îndeosebi pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului.

Totodată, în zonele de câmpie din jumătatea de sud a țării, temperaturile maxime ridicate din aer, situate frecvent peste pragurile biologice critice de rezistență (30...32°C) ale plantelor, au determinat ofilirea temporară a frunzelor în orele de amiază la speciile prășitoare, iar la culturile de toamnă s-a înregistrat coacerea forțată.

Orz Grâu de toamnă

Sub aspect fenologic orzul și grâul de toamnă parcurg maturitatea în lapte (70-100%) și ceară (20-100%), pe aproape întreg teritoriul agricol. La cultura de orz de toamnă se semnalează maturitatea deplină (10-100%), continuându-se lucrările de recoltare. De asemenea, în vestul țării se menține atacul de rugină (*Puccinia striiformis*) și ploșnița cerealelor (*Aelia* spp.).

Rapiță

Cultura de rapiță se află la formarea boabelor în silicve și maturitate deplină (10-100%), iar local în vestul și sud-estul țării au început lucrările de recoltare.

Floarea- soarelui

În funcție de data semănatului, floarea-soarelui înregistrează înfrunzirea (10-36 frunze), formarea capitulului (10-100%), precum și înflorirea (10-30%).

Porumb

La porumb se semnalează dezvoltarea aparatului foliar (9-19 frunze) și izolat apariția paniculului (10-25%), plantele prezentând în general o stare de vegetație bună și medie.

Sfecla de zahăr

La sfecla de zahăr predomină înfrunzirea (10-20 frunze) și alungirea/îngroșarea axei hipocotile (10-100%), în toate bazinele specializate.

Cartof

Cartoful se află în fazele de creștere a lăstarilor laterali, tuberizare și înflorire (10-100%), la nivelul întregii țări. În regiunile centrale și estice, local s-a semnalat apariția gândacului de colorado (*Leptinotarsa decemlineata*).

Pomi fructiferi

În plantațiile pomicele se înregistrează creșterea lăstarilor, dezvoltarea rodului și coacerea fructelor, continuându-se totodată lucrările de recoltare la speciile de sâmburoase timpurii (cireș, cais, vișin) ajunse la maturitatea de consum.

Vița de vie

La vița de vie s-au continuat fazele de creștere a frunzelor/lăstarilor, precum și formarea / dezvoltarea boabelor, în cea mai mare parte a podgoriilor.

În general lucrările agricole de sezon (fertilizări, erbicidări, prașile mecanice/manuale, tratamente fito-sanitare) s-au desfășurat în condiții bune, exceptând zilele cu precipitații.

Caracteristici agrometeorologice

La data de 30 Iunie 2017, rezerva de apă în cultura grâului de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm, se încadrează în limite satisfăcătoare (AS) până la apropiate de optim (ApO), pe aproape întreg teritoriul agricol. Conținutul de umiditate din sol se încadrează în limite scăzute (secetă pedologică moderată-SM) și deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică-SP și izolat extremă-SE) pe suprafețe agricole extinse din Oltenia și Dobrogea, local în sud-vestul, sudul și centrul Transilvaniei, vestul, nordul și nord-vestul Banatului, izolat în sudul Crișanei, nord-estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei, figura 1.




Figura 1.

În cultura de porumb, aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-100 cm, se situează în limite satisfăcătoare (AS), apropiate de optim (ApO) și izolat optime (AO), în aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată-SM și local puternică-SP) se înregistrează în cea mai mare parte a Olteniei, local în centrul și sud-estul Dobrogei, izolat în nord-vestul Banatului, sudul Crișanei și al Transilvaniei, nord-estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei, figura 2.




Figura 2.

Groupama Asigurări în parteneriat cu **A.N.M.** îți oferă prognoza agrometeorologică. Înscrie adresa de e-mail și ai acces gratuit la informații specializate pentru lucrările agro.

Abonează-te la newsletter