

# Groupama AgroMeteo

## Perspectiva meteorologică pentru luna decembrie 2016

- ⇒ Caracteristici agrometeo
- ⇒ Starea de vegetație

## Recomandări de specialitate

## Diagnoza lunii noiembrie 2016


- ⇒ Caracteristici agrometeo
- ⇒ Starea de vegetație

## Perspectiva lunii decembrie

 Pe ansamblu, luna decembrie 2016, se va caracteriza printr-o vreme normală în cea mai mare parte a țării. Local, în zonele sudice și sud-estice, valorile termice din aer se vor putea situa peste mediile multianuale.

 Sub aspect pluviometric, sunt posibile cantități de precipitații în general mai ridicate decât mediile multianuale, exceptând local, vestul, nord-vestul și sudul țării unde acestea vor fi apropiate de normele climatologice.

Aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.





## Caracteristici agrometeorologice

În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol 0-100 cm, la data de 31 decembrie 2016, se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, în majoritatea regiunilor agricole. În centrul și sudul Dobrogei se vor menține deficite de umiditate în sol, seceta pedologică fiind moderată și puternică.

## Starea de vegetație a culturilor agricole

În condițiile agrometeorologice menționate, în cea mai mare parte a regiunilor agricole se vor înregistra ritmuri lente de creștere și dezvoltare la speciile de toamnă, local fiind posibilă stagnarea temporară a proceselor vegetative.

În zonele cele mai reci din jumătatea de nord a țării, plantele se vor afla în repaus vegetativ. Pe ansamblu, uniformitatea și vigurozitatea culturilor se va prezenta bună și medie în semănăturile efectuate în epoca optimă, respectiv medie și slabă la cele întârziate fenologic, insuficient călite și nepregătite pentru condițiile de pe parcursul iernii.

|                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orz              | În funcție de data semănatului și condițiile pedo-climatice, cerealierele de toamnă (orz și grâu) vor parcurge fazele de răsărire, formare a frunzei a treia și înfrățire, la scara întregii țări. |
| Grâu de toamnă   |                                                                                                                                                                                                    |
| Rapiță           | La cultura de rapiță se va continua înfrunzirea pe întreg teritoriul agricol al țării, starea de vegetație a plantelor fiind în general bună și medie.                                             |
| Pomii fructiferi | Speciile pomi-viticole se vor afla în stadiul de repaus biologic în toate plantațiile, acestea fiind în general bine adaptate condițiilor de iernare.                                              |
| Vița de vie      |                                                                                                                                                                                                    |

În zilele fără precipitații, lucrările agricole de sezon (fertilizări, lucrări de întreținere în vii și livezi, etc.) se vor desfășura în general normal.



## Recomandări de specialitate

-  Efectuarea controlului biologic pentru determinarea sistematică a viabilității plantelor la cerealierele de toamnă;
-  Aplicarea îngrășămintelor minerale complexe la speciile de toamnă semănate în epoca optimă;
-  Continuarea lucrărilor de întreținere în vii și livezi.

## Diagnoza lunii noiembrie



### Starea de vegetație a culturilor agricole

Pe parcursul lunii noiembrie 2016, regimul termic al aerului a fost în general normal, în aproape toată țara. Astfel, ritmurile de creștere și dezvoltare ale speciilor de toamnă au evoluat în bune condiții în aproape toate regiunile agricole ale țării.

Local în Moldova și Transilvania, procesele vegetative ale plantelor s-au desfășurat mai lent datorită temperaturilor minime mai scăzute din aer și sol.

Starea de vegetație a plantelor s-a menținut medie și bună, în majoritatea zonelor de cultură.

### Rapiță

Cultura de rapiță parcurge dezvoltarea aparatului foliar pe întreg teritoriul agricol al țării, plantele având în medie 4-13 frunze, din care 1-2 frunze bazale fiind îngălbenite parțial.

### Orz

### Grâu de toamnă

În funcție de data semănatului și agrotehnica aplicată, culturile de orz și grâu de toamnă se află în fazele de răsărire (50-100%) și apariția frunzei a treia (30-100%), cele mai avansate în vegetație fiind culturile semănate în perioada optimă aflate în faza de înfrățire (10-50%).

### Pomi fructiferi

### Vița de vie

La speciile pomicole și viticole din majoritatea plantațiilor s-au definitivat fazele de maturare a lemnului/coardelor și căderea fiziologică a frunzelor, local înregistrându-se starea de repaus biologic.

Lucrările agricole de sezon s-au desfășurat pe ansamblu normal, în aproape toată țara.



## Caracteristici agrometeorologice

Rezerva de umiditate din sol pe profilul 0-50 cm, în cultura grâului de toamnă, la sfârșitul lunii noiembrie 2016, prezintă valori satisfăcătoare (AS), apropiate de optim (ApO) și optime (AO), în aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată-SM și puternică-SP) se înregistrează în centrul și sudul Dobrogei, figura 1.




Figura 1.

**Groupama Asigurări** în parteneriat cu **A.N.M.** îți oferă prognoza agrometeorologică.

Înscrie adresa de e-mail și ai acces gratuit la informații specializate pentru lucrările agro.

[Abonează-te la newsletter](#)