

GROUPAMA AGROMETEO



PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 01-15 OCTOMBRIE 2026

1. CARACTERISTICI AGROMETEOROLOGICE
2. STAREA DE VEGETAȚIE

RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE

DIAGNOZA PERIOADEI 16-30 SEPTEMBRIE 2026

1. STAREA DE VEGETAȚIE
2. EVOLUȚIA EVAPOTRANSPIRAȚIEI REALE
ÎN INTERVALUL 15-29 SEPTEMBRIE 2026
3. REZERVA DE UMIDITATE DIN SOL

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 01-15 OCTOMBRIE 2026

Pentru intervalul **01 – 15 octombrie 2026**, estimările meteorologice sunt realizate de către Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005 – 2024.

Fenomenele meteorologice extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Sub aspect termic, perioada *01-15 octombrie 2026* se va caracteriza printr-o vreme în general normală, pe majoritatea suprafețelor agricole.

Precipitațiile prognozate vor fi reduse cantitativ și chiar absente, în cea mai mare parte a țării. Regimul termic mediu diurn al solului la adâncimea de 5 cm va fi favorabil desfășurării fazelor incipiente de vegetație la rapița semănată până în prezent, precum și efectuării însămânțărilor la orzul și grâul de toamnă.

Precizăm că aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

1. CARACTERISTICI AGROMETEOROLOGICE

La data de **15 octombrie 2026**, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-20 cm (**ogor**), se va situa în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă), în cea mai mare parte a țării. Conținutul de apă din sol va prezenta valori satisfăcătoare și izolat apropiate de optim, local în nord-estul, estul și sudul Munteniei, nordul, nord-vestul, izolat estul și sud-estul Moldovei, nord-estul Transilvaniei și nordul Dobrogei.



2. STAREA DE VEGETAȚIE A CULTURILOR AGRICOLE

În aceste condiții, procesele de coacere și maturare la culturile prășitoare, pomii fructiferi și vița-de-vie, precum și cele de creștere la speciile de toamnă se vor desfășura în general normal în aproape toate regiunile, cu excepția zonelor depresionare din centrul și nordul țării, unde ritmurile de vegetație vor fi încetinite temporar, pe fondul temperaturilor minime mai scăzute din aer și sol.

Floarea-soarelui se va recolta de pe ultimele suprafețe agricole, la nivelul întregii țări.

Sub aspect fenologic, cultura de **porumb** va parcurge maturitatea deplină în jumătatea de nord a țării, iar la hibridii semitardivi și tardivi se va continua recoltarea, în aproape toate regiunile.

Sfecla de zahăr își va definitiva îngroșarea axei hipocotile, continuându-se totodată acumularea zahărului în rădăcină și începutul maturității tehnologice.

În principalele bazine specializate, **cartoful** aflat la maturitatea tehnologică se va recolta pe ultimele suprafețe agricole.

La speciile **pomicole și viticole** vor predomina acumularea zahărului în fructe/boabe, coacerea rodului, maturarea lemnului, precum și recoltarea eșalonată, în funcție de atingerea maturității depline.

Cultura de **rapită** semănată până în prezent se va afla la germinare, răsărire și formarea primelor frunze. De asemenea, la orzul și grâul de toamnă se vor extinde suprafețele agricole în curs de semănat.

Lucrările agricole de sezon (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, pregătirea patului germinativ, semănat, recoltare, etc.) se vor efectua în condiții relativ bune, în aproape toată țara.

RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE

- Eliberarea suprafețelor agricole de resturile vegetale;
- Continuarea lucrărilor de arat pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului în stratul 0-20 cm;
- Pregătirea patului germinativ și semănatul cerealielor de toamnă (orz și grâu) în perioada optimă;
- Recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole și a fructelor de sezon.

DIAGNOZA PERIOADEI 16-30 SEPTEMBRIE 2026

1. STAREA DE VEGETAȚIE A CULTURILOR AGRICOLE 1/2

În prima parte a perioadei **16-30 septembrie 2026** a predominat un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit, după care, spre sfârșitul intervalului s-a produs o răcire accentuată a vremii, la nivelul întregului teritoriu agricol. Precipitațiile semnalate au fost sub formă de ploi locale, izolat cu caracter de aversă, însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului, în majoritatea regiunilor.

Ca urmare, procesele de vegetație specifice acestei perioade, respectiv coacerea și maturarea la culturile de câmp, precum și cele de germinare și răsărire la speciile de toamnă semănate în epoca optimă s-au desfășurat pe ansamblu în ritmuri normale în majoritatea zonelor agricole, în special pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului.

La *floarea-soarelui* s-a finalizat faza de maturitate deplină (100%), continuându-se recoltarea în aproape toată țara, producțiile fiind pe ansamblu sub nivelul potențialului productiv al plantelor (Brăila-3800 kg/ha), *figura 1*.

Hibrizii semitardivi și tardivi de *porumb* s-au aflat predominant la coacere deplină (50-100%) și recoltare, în toate zonele de cultură, *figurile 2-3*. Local, producțiile obținute sunt diferențiate în teritoriu, fiind cuprinse între 12032 kg/ha la Sebeș, 10500 kg/ha la Brăila, 6200 kg/ha la Călărași și 3200 kg/ha la Arad.



Figura 1. Floarea soarelui / Tecuci
DMR Moldova



Figura 2. Porumb / Sărmașu
DMR Transilvania Sud



Figura 3. Porumb / Darabani
DMR Moldova

DIAGNOZA PERIOADEI 16-30 SEPTEMBRIE 2026

1. STAREA DE VEGETAȚIE A CULTURILOR AGRICOLE 2/2

Cultura de *sfeclă de zahăr* a parcurs fazele de îngroșare a axei hipocotile și acumulare a zahărului în rădăcină (70-100%), iar local în centrul țării s-a semnalat începutul maturității tehnologice (10-25%), starea de vegetație a plantelor menținându-se pe ansamblu bună și medie, *figura 4*. La *cartoful* pentru consum aflat la maturitatea tehnologică s-au extins suprafețele agricole recoltate, la nivelul întregii țări.

În plantațiile *pomi-viticole*, predominante au fost fazele de coacere a fructelor/boabelor, acumulare a zaharurilor, precum și începutul maturării lemnului, *figurile 5-8*. De asemenea, s-au desfășurat lucrările de recoltare, atât a fructelor, cât și a strugurilor pentru consum și vinificație. Cultura de *rapită* înființată în epoca optimă pe suprafețe restrânse a parcurs fazele de germinare-răsărire și izolat apariția primelor frunze, în special pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului. Totodată, lipsa apei din sol a determinat încetinirea proceselor biologice, local fiind posibilă răsărirea neuniformă a plantelor. Condițiile agrometeorologice au fost favorabile desfășurării lucrărilor agricole ale campaniei de toamnă în aproape toată țara (recoltare, transport, depozitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, pregătirea patului germinativ, semănat), exceptând zilele cu precipitații.



Figura 4. Sfeclă de zahăr / Brașov
DMR Transilvania Sud



Figura 5. Păr / Cluj-Napoca
DMR Transilvania Nord



Figura 6. Prun / Cluj-Napoca
DMR Transilvania Nord



Figura 7. Viță-de-vie / Drăgășani
DMR Oltenia



Figura 8. Viță-de-vie / Cotnari
DMR Moldova

2. EVOLUȚIA EVAPOTRANSPIRAȚIEI REALE ÎN INTERVALUL 15-29 SEPTEMBRIE 2026

Evoluția mediei zilnice a evapotranspirației reale ETR (mm/zi), calculată pentru pentru 0-20 cm/ogor, în intervalul 15 – 29 septembrie 2026 la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic, a prezentat tendință liniară de scădere a valorilor, mediile zilnice fiind cuprinse între 1,0...0,6 mm, figura 9.




Figura 9

Figura 10 evidențiază zonarea spațială a mediei evapotranspirației reale (ETR) în stratul de sol 0-20 cm/ogor, la stațiile meteorologice reprezentative pentru teritoriul agricol al țării, în intervalul 15 – 29 septembrie 2026. Valorile medii s-au situat între 0,6 și 1,1 mm.




Figura 10

*Evapotranspirația reală (ETR) este calculată prin metoda Penman-Monteith, în corelație cu fazele de vegetație, în stratul de sol 0-20 cm/ogor), utilizând datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie.

3. REZERVA DE UMIDITATE DIN SOL

Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-20 cm (ogor) la sfârșitul lunii *septembrie* 2026, s-a situat în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă) în cea mai mare parte a țării. Conținutul de apă din sol a prezentat valori satisfăcătoare și izolat apropiate de optim, local în nord-estul, estul și sudul Munteniei, nordul, nord-vestul, izolat estul și sud-estul Moldovei, nord-estul Transilvaniei și nordul Dobrogei, figura 11.





Figura 11

Semnificație legendă rezerva de umiditate:

** Rezerva de umiditate este determinată prin metoda bilanțului apei în sol utilizând datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie. Valorile de umiditate sunt validate periodic de măsurători directe efectuate cu senzori de umiditate, în platformele agrometeorologice.*



	Secetă pedologică extremă	~ < 20 % CAu
	Secetă pedologică puternică	~ 20 – 35 % CAu
	Secetă pedologică moderată	~ 35 – 50 % CAu
	Aprovizionare satisfăcătoare	~ 50 – 70 % CAu
	Aprovizionare apropiată de optim	~ 70 – 85 % CAu

%CAu - Reprezintă Capacitatea de Apă Utilă a solului (%)

**Groupama în parteneriat cu A.N.M îți oferă
prognoza agrometeorologică.**