GROUPAMA AGROMETEO

Groupama

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 17-30 NOIEMBRIE 2026

1. CARACTERISTICI AGROMETEOROLOGICE
2. STAREA DE VEGETAȚIE

RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE

DIAGNOZA PERIOADEI 01-16 NOIEMBRIE 2026

1. STAREA DE VEGETAŢIE
2. EVOLUȚIA EVAPOTRANSPIRAȚIEI REALE ÎN INTERVALUL 01-15 NOIEMBRIE 2026
3. REZERVA DE UMIDITATE DIN SOL

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 17-30 NOIEMBRIE 2026

Pentru intervalul ***17 – 30 noiembrie 2026***, estimările meteorologice sunt realizate de către Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005 – 2024.

Fenomenele meteorologice extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Sub aspect termic, intervalul *17 - 30 noiembrie 2026* se va caracteriza printr-o vreme în general normală, în cea mai mare parte a ţării.
Se întrevăd cantităţi de apă apropiate de normele climatologice în aproape toate zonele de cultură, exceptând unele areale agricole din vestul şi nordul ţării, unde local, precipitaţiile prognozate vor putea fi excedentare.
Regimul termic mediu diurn al solului la adâncimea de 10 cm se va menţine în limite favorabile parcurgerii ritmurilor de creştere şi dezvoltare ale plantelor, îndeosebi în semănăturile de toamnă efectuate în epoca optimă.

Precizăm că aceste informaţii nu exclud posibilitatea apariţiei unor situaţii cu valori extreme de temperatură sau cantităţi mai mari de precipitaţii pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

Groupama

1. CARACTERISTICI AGROMETEOROLOGICE

Rezerva de apă pe profilul de sol 0-50 cm în cultura grâului de toamnă se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată), se vor înregistra local în nordul și estul Moldovei, izolat vestul Banatului.



Groupama

2. STAREA DE VEGETAŢIE A CULTURILOR AGRICOLE

Pe ansamblu, condiţiile agrometeorologice menţionate vor fi optime parcurgerii ritmurilor de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă (rapiţă, orz şi grâu), pe majoritatea suprafeţelor agricole. De asemenea, în nordul şi centrul ţării, pe fondul temperaturilor minime mai scăzute din aer şi sol, ritmurile de creştere şi dezvoltare ale plantelor vor fi mai lente.

Cerealierele de toamnă (*orz* şi *grâu*), în funcţie de data semănatului şi agrotehnica aplicată vor parcurge germinarea, răsărirea şi apariţia frunzei a treia, cele mai avansate în vegetaţie fiind culturile semănate în perioada optimă aflate la începutul înfrăţirii.

Rapiţa se va afla predominant în fazele de răsărire şi creştere a frunzelor, starea de vegetaţie a plantelor fiind bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile efectuate tardiv.

Sfecla de zahăr se va recolta de pe ultimele suprafeţe agricole.

La *pomii fructiferi* şi *viţa-de-vie* se vor înregistra maturarea lemnului/cordelor, îngălbenirea şi căderea frunzelor, acestea fiind în general bine adaptate la condiţiile de iernare. Totodată, izolat se va putea declanşa faza de repaus vegetativ, în majoritatea plantaţiilor.

Lucrările agricole specifice, respectiv eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături de toamnă, fertilizări etc. se vor efectua în condiţii bune, pe aproape întreg teritoriul agricol al ţării.

Groupama

RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE

- **Finalizarea lucrărilor de eliberare a terenurilor agricole de resturile vegetale;**
- **Continuarea efectuării arăturilor adânci de toamnă;**
- **Aplicarea îngrăşămintelor minerale complexe la speciile de toamnă înfiinţate în epoca optimă;**
- **Administrarea tratamentelor fitosanitare şi efectuarea lucrărilor de întreţinere în plantaţiile pomi-viticole.**

Groupama

DIAGNOZA PERIOADEI 01-16 NOIEMBRIE 2026

1. STAREA DE VEGETAŢIE A CULTURILOR AGRICOLE 1/2

În primele zile ale perioadei ***01-16 noiembrie 2026*** a predominat un regim termic al aerului mai scăzut decât în mod obişnuit, după care, spre sfârşitul intervalului s-a produs o încălzire treptată a vremii, pe majoritatea suprafeţelor agricole. S-au semnalat precipitaţii sub formă de ploaie, însoţite de intensificări ale vântului, iar cantităţile de apă înregistrate au fost însemnate din punct de vedere agricol, în aproape toată țara. De asemenea, în zonele joase şi de luncă au fost condiţii de producere a ceţii, izolat asociată cu burniţă.

În majoritatea regiunilor agricole, ritmurile vegetative ale culturilor de toamnă şi maturarea lemnului la speciile pomi-viticole au evoluat pe ansamblu normal, în cea mai mare parte a regiunilor. De asemenea, în zonele depresionare, procesele de creştere şi dezvoltare la culturile de câmp s-au desfăşurat uşor mai lent, pe fondul temperaturilor minime mai scăzute din aer şi sol. Uniformitatea şi vigurozitatea culturilor de rapiţă, orz şi grâu de toamnă s-a prezentat în general bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile tardive.

La ***orzul*** şi ***grâul de toamnă*** înfiinţate în perioada optimă s-au înregistrat fazele de formare a frunzei a treia şi înfrăţire (10-100%), iar la culturile întârziate fenologic s-au continuat germinarea-răsărirea (30-100%) şi apariţia frunzei a treia (10-80%), *figurile 1-2*.



Figura 1. Grâu de toamnă / Vărădia de Mureș
DMR Banat-Crișana



Figura 2. Grâu de toamnă / Iași
DMR Moldova

DIAGNOZA PERIOADEI 01-16 NOIEMBRIE 2026

1. STAREA DE VEGETAŢIE A CULTURILOR AGRICOLE 2/2

Cultura de ***rapiţă*** a parcurs răsărirea (30-100%) şi formarea rozetei de frunze (6-10 frunze), la nivelul întregii ţări.

La ***sfeclă de zahăr*** din centrul şi nordul ţării s-au finalizat fazele de maturitate tehnologică (90-100%) şi recoltare.

Speciile ***pomicole*** şi ***viticole*** s-au aflat la maturarea lemnului/coardelor, îngălbenirea şi căderea fiziologică a frunzelor la nivelul întregii ţări, speciile fiind pregătite şi adaptate la condiţiile de iernare, *figurile 3-4*.



Figura 3. Măr / Cluj-Napoca
DMR Transilvania Nord



Figura 4. Viță-de-vie / Cotnari
DMR Moldova

Condiţiile agrometeorologice menţionate au fost favorabile desfăşurării lucrărilor agricole specifice campaniei de toamnă (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături de toamnă, fertilizări etc.) în majoritatea regiunilor agricole, acestea fiind întrerupte temporar doar în zilele cu precipitaţii.

Groupama

2. EVOLUȚIA EVAPOTRANSPIRAȚIEI REALE ÎN INTERVALUL 01-15 NOIEMBRIE 2026

Evoluția mediei zilnice a evapotranspirației reale ETR (mm/zi), calculată în cultura grâului de toamnă, în stratul de sol 0-20 cm, în intervalul *01 – 15 noiembrie 2026,* la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic a prezentat o tendință liniară de creștere a valorilor, mediile zilnice fiind cuprinse între 0,2...0,7 mm, *figura 5*.




Figura 5

Figura 6 evidențiază zonarea spațială a mediei evapotranspirației reale (ETR) în stratul de sol 0-20 cm, pentru cultura grâului de toamnă, la stațiile meteorologice reprezentative pentru teritoriul agricol al țării, în intervalul *01 – 15 noiembrie 2026*.
Valorile medii s-au situat între 0,2 și 0,5 mm.




Figura 6

**Evapotranspirația reală (ETR) este calculată prin metoda Penman-Monteith, în corelație cu fazele de vegetație, pentru cultura grâului de toamnă, în stratul de sol 0-20 cm, utilizând datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie.*

Groupama

3. REZERVA DE UMIDITATE DIN SOL

Rezerva de apă pe profilul de sol 0-50 cm la data de 16 noiembrie 2026, în cultura *grâului de toamnă*, se situează în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată), se înregistrează local în nordul și estul Moldovei, izolat vestul Banatului, *figura 7*.




Figura 7

Semnificație legendă rezerva de umiditate:

Secetă pedologică moderată	~ 35 – 50 % CAu
Aprovizionare satisfăcătoare	~ 50 – 70 % CAu
Aprovizionare apropiată de optim	~ 70 – 85 % CAu
Aprovizionare optimă	~ 85 – 100 % CAu

**Rezerva de umiditate este determinată prin metoda bilanțului apei în sol utilizând datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie. Valorile de umiditate sunt validate periodic de măsurători directe efectuate cu senzori de umiditate, în platformele agrometeorologice.*

%CAu - Reprezintă Capacitatea de Apă Utilă a solului (%)

Groupama în parteneriat cu A.N.M îți oferă prognoza agrometeorologică.

Groupama